

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

0.1 Member State	HU
0.2.1 Species code	1214
0.2.2 Species name	Rana arvalis
0.2.3 Alternative species scientific name	Rana arvalis wolterstorffi
0.2.4 Common name	hoszúlábú mocsári béka

1. National Level

1.1 Maps

1.1.1 Distribution Map	Yes
1.1.1a Sensitive species	No
1.1.2 Method used - map	Estimate based on partial data with some extrapolation and/or modelling (2)
1.1.3 Year or period	2007-2012
1.1.4 Additional map	No
1.1.5 Range map	Yes

2. Biogeographical Or Marine Level

2.1 Biogeographical Region

Pannonian (PAN)

Kiss I. (ed.), Bakó B., Dankovics R., Kovács T. és Szénási V. (2007): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretein belül végzendő „Kétéltűek és hüllők monitorozása a NBmR keretein belül 2006–2007”. Kutatási jelentés, KvVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 105 pp.

Kiss I. (ed.), Bakó B., Dankovics R., Kovács T. és Szénási V. & Vörös J. (2008): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretein belül végzendő „Kétéltűek és hüllők monitorozása a NBmR keretein belül 2008–2009”. Kutatási jelentés, KvVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 120 pp.

Kiss I. (ed.), Bakó B., Dankovics R., Kovács T. és Szénási V. (2009): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretein belül végzendő „Kétéltűek és hüllők monitorozása a NBmR keretein belül 2009–2010”. Kutatási jelentés, KvVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 120 pp.

Puky M., Schád P. (2009): The amphibian and reptile fauna of the Bodrogköz region in Hungary. Thaiszia Jornal of Botany., Košice, 19, Suppl. 1 :pp.: 403-411.

Kiss I. (szerk.), Babocsay G., Bakó B., Dankovics R., Kovács T., Szénási V. (2010): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretein belül végzendő „Kétéltűek és hüllők monitorozása a NBmR keretein belül 2009–2010”. Kutatási jelentés, KvVM Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 120 pp.

Kiss I. (szerk.), Babocsay G., Bakó B., Dankovics R., Kovács T., Szénási V. Vörös J. (2012): Kétéltűek és hüllők monitorozása a NBmR keretein belül 2012-ben.” Jelentés. Vidékfejlesztési Minisztérium és Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest. 88 pp.

Bakó B. (2012): A somogyi Baláta-tó Természetvédelmi Területen végzett kétéltű- és hüllőmonitorozás. Kutatási jelentés. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs. p. 23.

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Szénási V. (2012): A Tápió-vidék herpetofaunája. Rosalia a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei (7) Budapest. pp.: 543-553.

2.3 Range

2.3.1 Surface area - Range (km ²)	15219		
2.3.2 Method - Range surface area	Estimate based on partial data with some extrapolation and/or modelling (2)		
2.3.3 Short-term trend period	2001-2012		
2.3.4 Short-term trend direction	stable (0)		
2.3.5 Short-term trend magnitude	min	max	
2.3.6 Long-term trend period	N/A		
2.3.7 Long-term trend direction	min	max	
2.3.8 Long-term trend magnitude	area (km ²)	approximately equal to (≈)	
2.3.9 Favourable reference range	operator unknown method	No	
2.3.10 Reason for change	Improved knowledge/more accurate data Use of different method		

2.4 Population

2.4.1 Population size (individuals or agreed exception)	Unit	N/A			
	min	max			
2.4.2 Population size (other than individuals)	Unit	number of map 10x10 km grid cells (grids10x10)			
	min	163	max	163	
2.4.3 Additional information	<p>Definition of locality Conversion method Problems</p>				
2.4.4 Year or period	2007-2012				
2.4.5 Method – population size	Estimate based on partial data with some extrapolation and/or modelling (2)				
2.4.6 Short-term trend period	2001-2012				
2.4.7 Short term trend direction	stable (0)				
2.4.8 Short-term trend magnitude	min	max confidence interval			
2.4.9 Short-term trend method	Estimate based on partial data with some extrapolation and/or modelling (2)				
2.4.10 Long-term trend period	N/A				
2.4.11 Long term trend direction	min	max confidence interval			
2.4.12 Long-term trend magnitude	N/A				
2.4.13 Long-term trend method					
2.4.14 Favourable reference population	number operator unknown method	more than (>) No			
2.4.15 Reason for change	Improved knowledge/more accurate data Use of different method				

2.5 Habitat for the Species

2.5.1 Surface area - Habitat (km ²)	3333,5	
2.5.2 Year or period	2001-2012	
2.5.3 Method used - habitat	Estimate based on partial data with some extrapolation and/or modelling (2)	
2.5.4 a) Quality of habitat	Moderate	
2.5.4 b) Quality of habitat - method	Az élőhelyeinek többségek védett és/vagy Natura 2000 területeken van. A	

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

mindenkorú csapadékviszonyok határozzák meg leginkább a vízmennyiségeket,. ökológiai állapotukat. Az NBmR fajprotokoll alapú monitorozása (http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR/keteltuhullo/NBmR%20k%C3%A9t%C3%A9lt%C5%B1-h%C3%BCl%C5%91%20potokollok%2020110330.pdf) alapján az élőhelyeik nagy részté folymatosan nyomon követik.

2.5.5 Short term trend period	2001-2012
2.5.6 Short term trend direction	stable (0)
2.5.7 Long-term trend period	N/A
2.5.8 Long term trend direction	3333,5
2.5.9 Area of suitable habitat (km ²)	Improved knowledge/more accurate data Use of different method
2.5.10 Reason for change	

2.6 Main Pressures

Pressure	ranking	pollution qualifer(s)
Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish) (H01)	high importance (H)	N/A
Pollution to groundwater (point sources and diffuse sources) (H02)	high importance (H)	N/A
other major groundwater recharge (J02.08.04)	high importance (H)	N/A
Drying out (K01.03)	medium importance (M)	N/A

2.6.1 Method used – pressures based only on expert judgements (1)

2.7 Main Threats

Threat	ranking	pollution qualifer(s)
trapping, poisoning, poaching (F03.02.03)	high importance (H)	N/A
Drying out (K01.03)	medium importance (M)	N/A
Pollution to surface waters (limnic & terrestrial, marine & brackish) (H01)	high importance (H)	N/A
Pollution to groundwater (point sources and diffuse sources) (H02)	high importance (H)	N/A
other major groundwater recharge (J02.08.04)	high importance (H)	N/A
problematic native species (I02)	high importance (H)	N/A

2.7.1 Method used – threats expert opinion (1)

2.8 Complementary Information

2.8.1 Justification of % thresholds for trends

2.8.2 Other relevant Information

Elsősorban alföldi faj, de dombvidékeken is előfordul. Vizsontlag gyakori az ország északkeleti részében, a Tisza mentén. Somogyban és a Dráva mentén is nagyobb lokális állományai élnek. A Dunántúlon a Balatontól északra ritkább, de a Dunától keletre alkalmas élőhelyeken számos helyen előfordul.

2.8.3 Trans-boundary assessment

2.9 Conclusions (assessment of conservation status at end of reporting period)

2.9.1 Range assessment Inadequate (U1)
qualifiers stable (=)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

2.9.2. Population	assessment Inadequate (U1) qualifiers stable (=)
2.9.3. Habitat	assessment Inadequate (U1) qualifiers stable (=)
2.9.4. Future prospects	assessment Inadequate (U1) qualifiers stable (=)
2.9.5 Overall assessment of Conservation Status	Inadequate (U1)
2.9.5 Overall trend in Conservation Status	stable (=)

3. Natura 2000 coverage and conservation measures - Annex II species

3.1 Population

3.1.1 Population Size	Unit	N/A
	min	max
3.1.2 Method used	N/A	
3.1.3 Trend of population size within	N/A	

3.2 Conversation Measures

Térképmelléklet az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készített országjelentéshez
2013.

Mocsári béka

(*Rana arvalis*)

IV. melléklet

