

Éves jelentés a Latorvár barlangkutató csoport Latorpusztai Szeles-barlangban végzett kutatási tevékenységéről 2015

Készítette: Kocsis János

Kocsis Gergely

Stieber József

Jóváhagyta: Stieber József barlangi kutatásvezető

Lezárva: 2016. február 15.-én

A Szeles bg. kutatási története

Az 1930-as években nyitották meg azt a kis kőbányát, amely Kecet tetőtől ÉNy-ra fekszik.

Az 1971-ben, a területet kutató barlangászok (Benedek Gábor „Bubu”, Kertész Tamás „Tomi bácsi”, Kenéz Jutka „Csutak”, Mikola Gábor „Gábika”,) figyeltek fel a felhagyatott kőfejtő oldalában levő arasznyi lyukra, amelyből nagyon erős, hideg huzatot észleltek.

Az Erdélyben levő Szelek barlangja elnevezése alapján adták a Szeles barlangot.

A kezdeti megbontások során sikerült a jelenlegi nagy, furatolt kőtömb mögé bejutniuk, de a későbbiekben a kutatással felhagytak.

A későbbiekben a Lóczy Lajos Barlangkutató Csoport 1976-77 körül is próbálkozott a barlang bontásával. A bejáratú akna kidúcolásával egyéb feltáró munkát nem végeztek.



1. sz. fotó: a Szeles-barlang bejárata 1977-ben (Fotó: Fónyad Béla)

A legelső térképet Tóth Csaba készítette 1978-ban. 2008-ban a Latorvár Barlangkutató Csoport (Dianovszky Tibor, Kocsis János kutatásvezetők) irányításával kb. 1,5 m szintet sikerült lesüllyeszteni a bejárati akna alatt.

A szint süllyesztés során korábbi bontások szerszámai is előkerültek.


2010 májusában 15-20 cm magas álló jégcsapokat találtunk, míg augusztusban -5 C fok kiáramló hőmérsékletet mértünk.

2012 júliusában, amikor országos hőségriadó volt, a bejárati aknában megfagyott lavór méretű jégtömböt találtunk, míg a külső környezeti hőmérséklet +32 C fok volt.

A jégtömb kialakulása feltehetően a befolyt eső víz és a kiáramló hideg levegő okozta.

Az akkori mérések szerint a kiáramló lég hőmérséklet -2 C fok és $55\text{ m}^3/6$ volt.

A további szintsüllyesztések során sikerült mérésekkel behatárolni a légáram tényleges helyét (Stieber József, Dr. Kováts László Dezső).



1. sz. ábra: a Szeles-barlang első térképe 1978-ból (Tóth Csaba)

Az a hasadék ahol az erős légáramlat jelentkezik, a járat szelvénye miatt sajnos nem járható és szálkőben található.

A huzatos hasadéktól jobbra találtunk összetöredezett szakaszt, ami bontható és feltehetően eljutunk a huzatos szakasz másik végéhez.




2. sz. fotó: a Szeles-barlang bejárta 2004-ben (forrás: Barlangtani Intézet adatbázis)

Beszámoló a feltáró tevékenységről

2015. évben a Latorvár Barlangkutató Csoport Kocsis János kutatásvezető-helyettes állandó felügyelete alatt és Stieber József kutatásvezető ellenőrzésével, a barlang feltáró kutatását 2015 decemberéig, havi rendszerességgel végeztük el.



A kutatási napokon 4-6 fővel, napi 4-5 órát dolgoztunk a barlangban, a munkaórák száma 2015-ben 50 óra volt. Ez idő alatt kb. 6,3 m³ kőtörmeléket távolítottunk el, kőtömbök és törmelék formájában. A bontási munkákat kéziszerszámokkal és gépesítve (akkumulátoros gépek használatával) végeztük, a törmeléket hevederfüllel ellátott műanyag „badellákban” szállítottuk ki a barlang előtti kőfejtőbe. A barlang bejáratban elhelyeztünk egy „Vigyázz omlás veszély!” feliratú táblát is.

A feltáró munkákról készült munkatérképet az alábbiakban közöljük. Mivel a barlangot jelentősen kibővítettük, ezért célszerű volt annak újbóli feltérképezése. Nagy méretű fekete nyilakkal tüntettük fel a téli légáramlási irányokat, melyeket ismételtelen légfestéssel igazoltunk.



(1. oldal) Szeles BG

Szeles BG Felülnézet
Készült: 2014.01.18.
Felmérést készítették:
Fedor Béla
Kocsis János



nézet iránya 270°, a lejtésszöge 90°. Méretarány 1:33



3. sz. fotó: a barlang bejárata télen, havas környezetben. Kigőzölgés nincs, a felszíni hideg levegő folyamatosan áramlik a barlangba, lejegesítve annak bejárati lejtőjét
(fotó: Stieber József)



4. sz. fotó: a barlang bejáratának környezete. Bal oldalt a kitermelt köveket látjuk.
(fotó: Stieber József)

A feltárás irányának megerősítésére 2 alkalommal (téli légkörzés mellett és átmeneti időszakban) légfestést végeztünk a barlangban, melyet finomszemcsés mészkőporral hajtottunk végre. Az áramlás nagyobb része a hegy felé tartó járatban (Észak-keleti-ág) tűnt el, ezért a további kutatásokat is ebbe az irányba folytattuk.



5. sz. fotó: téli időszakban a barlang falait látványos jégkristály-réteg borítja (fotó: Stieber Bence).



6. sz. fotó: a DNY-i oldalág munkagödrének alján a repedések közt tűnik el a hideg felszíni levegő nagyobb része. A levegő útját CO2 méréssel is követni tudjuk. A jobb oldali falon jégkristályok rakódtak le (fotó: Stieber Bence).



6. sz. fotó: a DNY-i oldalág D-i végpontja. A járat magassága itt meghaladja a 2 métert, azonban folyamatosan szűkül össze, járhatatlan méretűre. A hideg levegő a kép bal felső részében található repedések felé áramlik (fotó: Stieber Bence).



7. sz. fotó: munka közben a már kitágított ÉK-i oldalágban (fotó: Kocsis Gergely)



8. sz. fotó: rá se lehet ismerni a korábban csak kúszva megközelíthető ÉK-i oldalágra
(fotó: Kocsis Gergely)



9. sz. fotó: a bejáratnál lejtaknába egy ötletes szerkezetet építettünk, mely a kutatás időtartama alatt kettős funkciót lát el. A képen éppen felhúzó csúszdaként funkcionál (fotó: Kocsis Gergely).




10. sz. fotó: A felhúzó csúszda egy mozdulattal átalakítható biztonságosan használható mászó-létrává, mely nagyban segíti a barlangból történő gyors kijutást (fotó. Kocsis Gergely)




11. sz. fotó: a DNY-i oldalág falán több helyen találhatunk lejegesedett lepkéket, melyek behúzódtak a” biztonságot ígérő” barlangba (fotó: Stieber Bence).

Beszámoló a klimatológiai mérés eredményeiről



1. sz. diagram: a barlangi hőmérséklet menete 2012 őszétől 2013 őszéig terjedő időszakban. Látható, hogy decembertől áprilisig a barlangba befelé áramlik a hideg felszíni levegő, mely lehűti a járatokat és ott jeget rak le. Áprilistól szeptemberig megfordul a légáramlat, és a lehűlt barlangi levegő folyamatosan visszamelegedve áramlik a felszín felé.




2. sz. diagram: a felszíni hőmérséklet éves menete 2012 őszétől 2013 őszéig terjedő időszakban (forrás: OMSZ-Bükkábrányi mérőállomása)


A hőmérséklet éves menetét a barlangban 4 éven át beépített elektromos hőfok-regisztrálóval rögzítettük. Az eredményeket az 1., 3., 4. és 5. sz. diagramokon rögzítettük. A barlang klímájának tanulmányozásához szükséges volt, hogy a Bükkábrányi OMSZ-meteorológiaiállomásnál közelebbi felszíni hőmérsékleti adatokkal rendelkezünk (lásd, 2. sz. diagram). Ennek érdekében közvetlenül a barlang bejárata fölött 5 méterre egy hőmérsékleti adatgyűjtőt helyeztünk el. A gyűjtött adatokat a 6. sz. diagramban közöljük.

A jelenség viszonylag egyszerűen magyarázható és kiváló külföldi példákat találunk rá, azonban Magyarországon meglehetősen ritka! Jól mutatja azonban, hogy a kb. 10 m hosszúságban és -5 m mélységben ismert kisbarlang a mélyben egy sokkal nagyobb és feltehetően az év nagyobb részében jéggel kitöltött nagybarlanggal áll kapcsolatban, ahova a novemberi fagyoktól a márciusi hóolvadásig az északi bejáraton becsorog a sűrű, hideg, fagyos levegő, utat találva magának a mélyebben fekvő nagyobb járatok felé.

Itt az évtizedek alatt vastag jégréteget alkotott, mely aztán a kifelé forduló tavaszi-nyári-őszi levegő hőmérsékletét meghatározza. A leghidegebb levegő májusban jön ki a barlangból, majd hőmérséklete a jég olvadása következtében fokozatosan emelkedik, de fagypont alatt marad még júniusban is, hiszen július elején még a becsorgó csapadékvizeket megfagyasztja. A meleg nyárnak köszönhetően a kőzetrepedéseken keresztül után-pótlódó barlangi levegő lassan visszaolvasztja a jeget és augusztus végére már hőmérséklete fagypont fölé emelkedik.




3. sz. diagram: a barlangi hőmérséklet menete 2013 őszétől 2014 februárig terjedő időszakban. Látható, hogy decembertől februárig a barlangba befelé áramlik a hideg felszíni levegő, mely lehűti a járatokat és ott jeget rak le. A lehűlés mértéke sokkal kisebb, mert 2013 tele sokkal enyhébb volt, mint a 2012-es. A jég mennyisége is kevesebb volt a barlangban.




4. sz. diagram: a barlangi hőmérséklet menete 2014 februártól 2015 februárig terjedő 1 éves időszokban. Látható, hogy decembertől februárig a barlangba befelé áramlik a hideg felszíni levegő, mely lehűti a járatokat és ott jeget rak le. Áprilistól szeptemberig megfordul a légáramlat, és a lehűlt barlangi levegő folyamatosan visszamelegedve áramlik a felszín felé. A lehűlés mértéke ugyanakkora volt, mint az előző télen.

A barlangi hőmérséklet legmagasabb értékét a teljes olvadással október végére éri el (de a kiáramló levegő hőmérséklete így is alatta marad a Bükki-barlangok 8°C-os átlaghőmérsékletének. Az egész folyamat a novemberi fagyokkal újrakezdődik: a légmozgás megfordul és elindul a jégképződés. A Bükki- Szeles-barlang egyedülálló jelensége csak addig tartható fenn, amíg a bejárat jellege és környezete a jelenlegi állapotában marad.


Az elmúlt évtizedek kutatói a bejáratot folyamatosan tágították: jelenleg kb. négyszer akkora felületű, mint 1977-ben volt. Ez együtt jár téli időszakban a beáramló levegő térfogat-áramának értelemszerű növekedésével, de ez igaz a nyári időszak kiáramlására is. Sajnos a korai időszakban nem lett rögzítve a kiáramló levegő hőmérséklete, így nem tudjuk, hogy a bejárat tágítása milyen módon változtatott a barlang jegesedésén. Az azonban biztos, hogy jelentősebb járat-növekedés vagy fokozott védelmet igénylő védett természeti érték esetleges feltárása esetén a barlangot csak teljes felületen légáteresztő (rácsozott) ajtóval lehet ellátni.




5. sz. diagram: a barlangi hőmérséklet menete 2015 februártól 2015 novemberéig terjedő közel 1 éves időszakban. Látható, hogy februártól ápriliséig a barlangba általában befelé áramlik a hideg felszíni levegő, mely lehűti a járatokat és ott jeget rak le. Ezen időszakban többször is volt, hogy megfordult a légáramlás, mivel már márciusban is többször voltak melegebb időszakok. Áprilistől szeptemberig megfordul a légáramlat, és a lehűlt barlangi levegő folyamatosan visszamelegedve áramlik a felszín felé. A lehűlés mértéke kisebb volt, mint az előző télen.



6. sz. diagram: a felszíni hőmérséklet éves menete 2015 februártól 2015 novemberéig terjedő időszakban, a barlang fölött elhelyezett hőmérséklet-adatgyűjtő alapján



7. sz. ábra: a talajhőmérsékletek tipikus eloszlása barna erdei talaj esetében, 10 cm mélységben. A mérés 2014 januárban történt, amikor a levegő hőmérséklete 9,8°C volt, azonban az elmúlt hetekben rendszeres éjszakai fagyok voltak. Látható, hogy az aszfaltozott út fölött 10 méterre nyíló barlangbejárat körül - a hegyoldalról lecsorgó hideg levegő hatására – a talaj átfagy, míg az aszfaltozott út túloldalán (10 méterre a barlang bejáratától) már enyhébb hőmérsékleti viszonyok tapasztalhatók. A talajhőmérséklet 10 cm méter mélységben a hónapos átlag csúsztatott, integrált értékét mutatja



7. sz. ábra: a talajhőmérsékletek tipikus eloszlása barna erdei talaj esetében, 10 cm mélységben. A mérés 2015 januárban történt, amikor a levegő hőmérséklete -1,8°C volt. A tapasztaltak megegyeznek az 1 évvel korábban rögzítettekkel.

Összefoglaló:

A 2015-ben feltárt új részek hossza: 3 m
A barlang teljes hossza: 18 m
A barlang vertikális kiterjedése: - 4 m

Budapest, 2016-02-15



Stieber József

Barlang klimatológus, szakértő

Barlangi kutatásvezető

Kutatási engedély száma: 16551-5/2012