

Észak-Cserehát MTÉT


- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) Aggtelek | (22) Kány |
| (2) Alsószuha | (23) Kelemér |
| (3) Alsótelekes | (24) Keresztéte |
| (4) Becskháza | (25) Komjáti |
| (5) Bódvalenke | (26) Martonyi |
| (6) Bódvarákó | (27) Meszes |
| (7) Bódvaszilas | (28) Pamlény |
| (8) Debréte | (29) Percse |
| (9) Dövény | (30) Perkupa |
| (10) Égerszög | (31) Ragály |
| (11) Felsőkelecsény | (32) Rakaca |
| (12) Felsőnyárad | (33) Rakacaszend |
| (13) Felsőtelekes | |
| (14) Gagybátor | |
| (15) Galvács | |
| (16) Gömörszőlős | |
| (17) Hidvégardó | |
| (18) Imola | |
| (19) Jákfalva | |
| (20) Jósvafő | |
| (21) Kánó | |

Teljes terület: 53 713 ha
 Támogatható terület: 27 534 ha
 Natura 2000 területek aránya: 44%
Kapcsolat:
 Krajnyák Cecília
 tel.: (30) 634-7343 Fax: (48) 506-001
 e-mail: info.anp@t-online.hu



Az igényelhető zonális agrár-környezet-gazdálkodási célprogramok:

	A zóna		
	B zóna		
	C zóna		



- | |
|------------------|
| (34) Rudabánya |
| (35) Serényfalva |
| (36) Szalonna |
| (37) Szászfa |
| (38) Szendrő |
| (39) Szin |
| (40) Szinpetri |
| (41) Szögliget |
| (42) Szőlősardó |
| (43) Szuhafő |

- | |
|-----------------------|
| (44) Terezstenye |
| (45) Tornabarakony |
| (46) Tornakápolna |
| (47) Tornanádaska |
| (48) Tornaszentandrás |
| (49) Tornaszentjakab |
| (50) Trizs |
| (51) Varbóc |
| (52) Viszló |
| (53) Zádorfalva |
| (54) Zubogy |



Burinda Tamás – Csereháti látkép az Alsó-hegyről

Területét a Cserehát, mint törzsterület, valamint a Tornai-dombság, a Bódva-völgy felső szakasza, az Aggteleki-Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság térkép által lehatárolt részei adják.

Az MTÉT területén fellelhető természetes karsztbokorerdők, sziklagyepek, láp- és mocsárrétek mellett kiemelkedő fontosságúak az emberi tevékenység hatására kialakult másodlagos élőhelyek: fás legelők, kaszálók, kisparcellás mezőgazdasági területek, melyek természeti értékei a hagyományos gazdálkodás és a legeltetés hanyatlásával, a művelés felhagyásával veszélybe kerültek.

Változatos a táj, a vízfolyások mentén fűz- és égerligeteket, a dombokon cseres-tölgyes és gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőket, a mészkőkibúvásokon karsztbokorerdőket találunk.

Az év jelentős részében vagy folyamatosan víz által elborított területeken megjelenő fűzlápok, bokorfüzesek és velük mozaikszerűen keveredő fátlan társulások jelentős természeti értéket képviselnek. A nedves területek ritka növényfajai között említhető a kígyógyökerű keserűfű, a kockásliliom, a kornistárnics, a mocsári kosbor, a széleslevelű ujjaskosbor, a szibériai nőszirm, a zergeboglár, vagy az északi sás. Ugyanezen gyepeken számos védett lepkefaj (vérfű boglárka, gólyaorr boglárka, nagy tűzlepke) erős állománya él.



Streit Béla – Haris

Az Észak-Cserehát MTÉT program célja a táj jellegének, értékeinek, a természetes és fél-természetes élőhelyeinek megőrzése és fenntartása a hagyományos és természetkímélő gazdálkodási módok támogatásával.



Huber Attila – Konkoly

A száraz gyepek védett növényei többek között a csinos árvalányhaj, a leánykökörcsin, a magyar nőszirm és a nagyzezerjófű, a rovarfaunából pedig többek között a nagyfoltú boglárka, a hegyi törpeboglarca és a magyar tarkalepke képvisel kiemelkedő értéket a területen.

A térségben még fellelhető rövidfűvű legelőkön él az ürge. Állományának megőrzése ragadozómadár-védelmi szempontból is fontos, mert a területen megtalálható parlagi és békászó sas egyik legfontosabb tápláléka.

A nedves gyepek, illetve még be nem erdősült magassásosok ritka költő madara a fokozottan védett haris.

A Cserehát hagyományos kisparcellás mezőgazdasági területeinek ritkuló madara a fogoly és a fűrj, növények közül a konkoly és a búzavirág. A művelés alól felhagyott területeken a beerdősülés különböző fázisaiban lévő egykori legelők madara a búbos banka. Ugyanitt jellemző fészkelő faj a tövisszúró gébics és a karvalyposzáta. Az egyedi tájképi értéket képviselő fás legelőkön kétszáz éves faegyedekkel is találkozhatunk.