



A töbör aljára néha
vizzáró agyag rakódik le.
Az összegyülekező
csapadék nem tud
elfolyni: dolinató
keletkezik
(Aggteleki-hegység)


Nem holdbeli táj,
hanem tölcser alakú
töbörökkel teli
karsztfennsík
(Albánia)



a karsztjelenségeken
keresztül mutatjuk
be a felszín kezdeti le-
pusztulásától a bar-
langok kialakulásáig.

A karsztosodás fo-
lyamata igen lassú;
jellegzetes karsztvi-
dékeinken: az Észak-
borsodi karszton és a
Bükk-hegységben lát-
ható karsztjelensé-
gek (töbrök, barlan-
gok stb.) kialakulása
évmilliókkal ezelőtt
indult meg.

A csapadék
nagyobb része
nem beszivárgás,
hanem víznyelők útján
jut a mészkőfennsík
belsejébe ...
(Ördög-lyuk)



... ahol tágas barlangjáratokon keresztül halad
tova ... (Béke-barlang)

**SZÖVEG ÉS FOTÓ:
HAZSLINSZKY TAMÁS**

... míg végül
a karsztfennsík lábánál
— sokszor patak
vagy kisebb folyó méretű —
karsztforrás
formájában tör felszínre
(Bihar-hegység)



**HOGYAN
SZÜLET-
NEK
A
BAR-
LANGOK**

