

tervei szerint Kolb kertfelügyelő létesítette biológiai csoportokról, melyeket 1893. évben tekintett meg s melyeket a szemléleti oktatás kiváló segédeszközének s a további megfigyelésekre serkentőnek jelöl.

Az erre kifejlődő eszmecserében Klein Gyula megemlíti, hogy a biológiai csoportok kezdeményezője Heinricher innsbrucki tanár volt, Staub ellenben azt tartja, hogy Berlinben kezdtek legelőször e csoportok alakítását, Mágócsy szerint pedig Heinricher az eszmét már Gráczból, hol tanársegéd volt, vitte át, mert Leitgeb még a régi gráciai növénykertben foglalkozott ilyen csoportok elhelyezésével.

3. Francé Rezső »Barlanglakó gomba« czímen bemutatja az *Isaria Eleutheratorum* Nees ab Esenb. nevű gombát, mely többféle barlanglakó bogáron fordul elő, s melyet 1894 november havában több bihar-megyei barlangban, így különösen a fonáczai barlangban talált.

4. Perlaky Gábor bemutatja Richter Aladár dolgozatát »A jávai mérég vagy upaszfa (*Antiaris toxicaria* Lesschen) főleg histológiai szempontból«, melyben szövettani alapon kimutatja, hogy az indiai szigeteken az *A. toxicaria*-n kívül csak az *A. Bennettii* Seem. és *A. Saccidora* Dol. fajok vannak, mely utóbbi fiziológiai okoknál fogva aligha volna elválasztható az *A. toxicaria*-tól.

5. Ezek után a jegyző bemutatja Simonkai Lajos-nak megjegyzéseit az előbbi jegyzőkönyveknek némely közlésére.

A *Stipa dasypphylla* Czern. (Közlöny 50. l.) a »Conspectus pl. Charkow« 75. lapján van közölve minden jellemzés nélkül, s így mint nomen nudum a nomenclatura szabályai szerint semmit sem számít; ellenben Lindemann a Fl. Cherson II. (1882) 283.

lapján a következő szavakkal írja le: »Foliis irois planis, demum convolutis pilosis«. Ezen steppei növény eredeti vizsgálatai s összehasonlításai szerint nem egyezik meg a *St. Austriaca* Beck-vel terméseiben és leveliben, hanem a merev, szinte porczogós és kemény levelű *St. Grafiana* Stev.-nel, s így nem egyezik meg a mi *villifoliódnkkal* sem, melynek levelci sokkal gyöngédebbek, fűneműebbek, s termései is kisebbek mint a *St. dasypphylla*-é, melynek szárlevelci és különösen a legfelsőbbek szőrösök, virágzati tengelyének alja szőrösödő és hengeres, holott a mi szőröslevelű *Stipánk* szárlevelci, különösen a legfelsőbbek meztelenek és virágzati tengelyének alja teljesen meztelen és a mellett karczott.

A Közlöny 51. lapján említett új Elymus, melyet Perlaky Gábor Szt.-Endre mellett talált, az eredeti portugali és délfraancia példányokkal való összehasonlítás után sem mutatkozik egyébként mint *E. Caput medusae* L.-nek.

A Közlöny 302. füzetének 555. lapján a mi *Nymphaea thermalis*-ünk eddig megczáfolatlanul *Nymphaea mystica*-nak van mondva, holott a *Costalia mystica* Salisb. De Candolle szerint nem egyéb, mint *Nymphaea Lotus* DC. vagyis *N. Aegyptica* Simk., ellenben a *N. mystica* Salisb. annyi mint *N. thermalis* DC., úgy hogy a *mystica* faj-név minden áron törlendő s a *N. thermalis* DC. fenntartandó.

6. Ezután bemutatja jegyző Dr. Zahbruckner S. »Zur Flechtenflora des Pressburger Comitatus« czímen megjelent értekezését, s végül kiosztja a Gremspurger Mihály »A hesseni légy legendája« című füzeteket, melyeket szerző a növény-tani szakosztály tagjainak küldött. — Köszönetet vették át.

LEVÉLSZEKRÉNY.

TUDÓSÍTÁSOK.

(7.) Felhívás Dr. Szabó József emlékének megörökítésére. Midőn a Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, hogy nagyérdemű boldogult elnökének, Dr. Szabó József egyetemi tanárnak emlékét a hazai szakmunkásság serkentését célzó módon megörökíti: ezzel a hazai geológia alapvető munkásának, hazánk természeti viszonyai legbuz-

góbb tanulóozójának, a páratlan szorgalmú tudósnak és tanárnak kívánja elismerését maradandóbb módon és tágabb körök hozzájárulásával is kifejezni.

A boldogultnak hazafias, tudományos és tanári érdemei ugyanis messze túlszárnyalták azt a kisebb kört, a melyben a Magyarhoni Földtani Társulat mozog. Az Ő munkáinak

Adak. L. 1895. 2